

ANESTEZIOLOGICKÝ DOTAZNÍK – dítě

Pro zajištění maximální bezpečnosti Vašeho dítěte prosíme o pravdivé odpovědi. Tam kde je na výběr prosím vaši odpověď označte, nebo zvýrazněte.

Jméno a příjmení dítěte rodné číslo dítěte

Věk výška cm hmotnost kg zdravotní pojišťovna:

Váš email Váš telefon

Mělo Vaše dítě někdy vážnější úraz, zejména hlavy, nebo mělo / má příznaky či stanovenou diagnózu onemocnění srdce, cév, plic (např. zápal plic, astma, chronický zánět průdušek), onemocněním ledvin, jater (např. žloutenka), svalů, štítné žlázy, očí, nervů (např. epilepsie, poruchy spánku), duševní, krevní (např. poruchy srážlivosti, snadná tvorba modřin, anemie, hemofilie, leukémie) metabolické, endokrinní, kožní, nebo jakékoli jiné onemocnění? (prosíme zatrhněte Vaši odpověď, ev. vypište)

..... **Ano** **Ne**

Je Vaše dítě v péči nějakého lékaře – specialisty (např. alergologa, neurologa, kardiologa, plicního lékaře, endokrinologa) ? Pokud ano, jakého? (prosíme zprávu vemte sebou)

..... **Ano** **Ne**

Užívá Vaše dítě pravidelně nějaké léky? Pokud ano, prosíme uveďte které: **Ano** **Ne**
(ev. léky dítěti podejte jako obvykle, léky určené k vdechování vemte sebou, spolu s příslušným vybavením)

.....

Bylo Vaše dítě v posledním roce ošetřeno lékařem? **Ano** **Ne**

Pro jaké onemocnění:.....

Předchozí operace dítěte? V kterém roce? **Ano** **Ne**

Přihodily se během ev. narkózy nějaké zvláštnosti? Jaké? **Ano** **Ne**

Přihodily se někdy nějaké komplikace během narkózy u pokrevních příbuzných dítěte? .. **Ano** **Ne**

Má Vaše dítě alergii, ať už na cokoli, nebo ekzém? ... **Ano** **Ne**

Důležité jsou ev. alergie na burské oříšky, sóju a vajíčka.

Má Vaše dítě snímatelné zubní náhrady, rovnátka, mezerník? **Ano** **Ne**

Jiné zvláštnosti, cokoli nám chcete sdělit? **Ano** **Ne**

DŮLEŽITÉ POKYNY:

Je bezpodmínečně nutné dodržet dobu lačnosti před výkonem: 8h od smaženého nebo tučného jídla, 6 hodin od posledního lehkého jídla a 2 hodiny od posledního napití čiré vody. V intervalu 2-6 hodin před výkonem se dítě může napít čirých tekutin bez bublinek – voda, slabý čaj nebo šťáva.

Mateřské mléko můžete dítěti podat nejpozději 4h před výkonem. U ostatních tekutin - mléčných, ovocných, zeleninových či jiných hustších nápojů, včetně tekuté kojenecké stravy a umělých mlék prosíme dodržte odstup 6 hodin. Doporučujeme dítěti 2-3h před výkonem nabídnout čiré tekutiny, např. vodu. 2 hodiny před výkonem již dítě nemůže pít nic, s výjimkou zapití léků douškem vody.

INFORMOVANÝ SOUHLAS S PODÁNÍM PREMEDIKACE / ANALGOSEDACE

Žádám o provedení výkonu v premedikaci / analgosedaci mého dítěte. Pročetl(a) jsem informace a doporučení rodičům a porozuměl(a) jsem jim. Měl/a jsem možnost mluvit s anesteziologem, klást otázky a pokud tomu tak bylo, byly všechny moje otázky zodpovězeny.

Datum: Vaše jméno a příjmení, podpis:

PREMEDIKACE A ANALGOSEDACE DÍTĚTE PŘI ZUBNÍM OŠETŘENÍ

INFORMACE A DOPORUČENÍ RODIČŮM

- Dítě **musí být před výkonem lačné**. Prosíme zajistěte, aby **6 hodin** před výkonem nic nejedlo a **2 hodiny** před výkonem ani nic nepilo. V intervalu 2-6 h před výkonem se dítě může podle chuti napít čirých tekutin bez bublinek – voda, slabý čaj nebo šťáva. Jejich množství nemusíte nijak omezovat. Čaj můžete osladit, tak aby vznikl slabý čirým roztok bez pevných částí. Mateřské mléko můžete dítěti podat nejpozději 4 hodiny před výkonem. U ostatních tekutin, včetně džusů, tekuté kojenecké stravy a umělých mlék, dodržte prosím odstup 6 hodin. K ošetření přinese, prosím, oblíbený nápoj dítěte (džus, kolu, čaj), bude s ním moci krátce zapít podanou premedikaci. **Mléčné nápoje nejsou vhodné. 2 hod. před výkonem už dítě nemůže nic pít.**
- Pokud vaše dítě užívá pravidelně léky, nebo v posledních dvou letech prodělalo jakékoli vážnější onemocnění, **žádáme vás o vyjádření Vašeho dětského lékaře k plánovanému výkonu**. Je-li dítě v péči specialisty (neurolog, kardiolog, endokrinolog apod.), **prosíme Vás o vyjádření daného specialisty k výkonu**. Užívá-li vaše dítě léky ke vdechování, vemte je sebou i s ev. pomůckami. Uvítáme, když dítěti přinesete lehkou deku a jeho oblíbený čirý, nemléčný nápoj bez kousků – šťávu nebo limonádu bez bublinek. Doporučujeme vzít sebou náhradní kalhoty, klidně dvojce.
- **Na ošetření přijďte 1h před plánovaným začátkem výkonu**. Pokud jsou v pořadí před Vámi výkony u dětí, může se přesný čas Vašeho zákroku lišit od naplánovaného, bohužel i výrazně. Za tuto komplikaci se předem omlouváme.

PRŮBĚH PREMEDIKACE / HLUBOKÉ ANALGOSEDACE DÍTĚTE

Před podáním jakéhokoli léku Vašemu dítěti proběhne předanestetické vyšetření Vašeho dítěte anesteziologem, v rámci kterého se budete moci zeptat na Vaše otázky a dohodnout detailní postup. Abychom minimalizovali stres dítěte z prostředí zubní ordinace, podáváme dítěti k vypití asi 10-15 minut před začátkem ošetření lék na uklidnění, který zapije jeho oblíbeným nápojem. Pokud jste si jisti že prostředí ambulance dítě nestresuje, není podání léku na uklidnění nutné. Pokud je u vašeho dítěte plánováno ošetření jen v tzv. **premedikaci**, k tomuto léku dostane i lék proti bolesti, a v průběhu ošetření zůstane částečně při vědomí. Pokud dle zvážení Vaší zubní lékařky či lékaře není premedikace dostačující, může Vám pro ošetření Vašeho dítěte doporučit **hlubokou analgosedaci**. To znamená nitrožilní podání léků navozujících dočasnou ztátu vědomí a silnější účinek proti bolesti, avšak se zachováním ochranných reflexů dýchacích cest. K nitrožilnímu podání léků je nutné zavést kanylu, většinou do ruky. S výhodou používáme znečitlivující mast, aby vpich dítěti pokud možno nevadil. Pro zavedení kanyly může být nutná i krátkodobá inhalační **celková anestezie** obličejovou maskou. Podání celkové anestezie může být nutné i v průběhu analgosedace. Pokud s tímto postupem v případě nutnosti nesouhlasíte, upozorněte na to Vašeho anesteziologa. Probouzení do kontaktu trvá většinou 1 až 2h. V tomto čase, někdy i do 3h po skončení zákroku, je dítě s doprovodem a po dohodě s anesteziologem propuštěno domů. Plné odeznění útlumu je individuální a **po tuto dobu je nutno věnovat dítěti zvýšený dozor**.

Analgosedaci ani premedikaci **není vhodné podávat** za současně probíhajícího onemocnění dýchacích cest, zejména se zvýšenou teplotou, kašlem, rýmou a celkovou únavou .

Pokud Vám cokoli není jasné, nebo máte další otázky, neváhejte se na nás obrátit. Protože pro nás jsou důležité Vaše zkušenosti s naším ošetřením, rádi bychom Vám s odstupem 2-3 týdnů zaslali mailem velmi krátký dotazník na toto téma. Pokud s krátkým dotazníkem nesouhlasíte, nevyplňujte prosíme Váš email.

Pokud budete potřebovat, více informací Vám podá MUDr. Hynek Sechovský, osobně na pracovišti, na mailu: hynek.sechovsky@gmail.com , nebo na tel: 604 188 477